



## HEMATOLOGIA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Hemograma completo (inclui contagem de plaquetas)	1 dia	jejum não necessário	
Eritrograma	1 dia	jejum não necessário	
Contagem de plaquetas	1 dia	jejum não necessário	
Pesquisa de hematozoários	1 dia	jejum não necessário	
Contagem de reticulócitos	1 dia	jejum não necessário	
Hematócrito	1 dia	jejum não necessário	

## BIOQUÍMICA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Albumina	1 dia	jejum de 12 horas	
Amilase	1 dia	jejum de 12 horas	
Bilirrubina e frações	1 dia	jejum de 12 horas	
Cloretos	1 dia	jejum de 12 horas	
Cálcio	1 dia	jejum de 12 horas	
Creatinina	1 dia	jejum de 12 horas	
Fosfatase alcalina	1 dia	jejum de 12 horas	
Fósforo	1 dia	jejum de 12 horas	
Frutosamina	1 dia	jejum de 12 horas	
GGT	1 dia	jejum de 12 horas	
Glicose	1 dia	jejum de 12 horas	
Globulina	1 dia	jejum de 12 horas	
Lipase	1 dia	jejum de 12 horas	
Potássio	1 dia	jejum de 12 horas	
Proteína total	1 dia	jejum de 12 horas	
Sódio	1 dia	jejum de 12 horas	
TGO (AST)	1 dia	jejum de 12 horas	
TGP (ALT)	1 dia	jejum de 12 horas	
Triglicérides	1 dia	jejum de 12 horas	
Uréia	1 dia	jejum de 12 horas	



## URINÁLISE

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Urina	1 dia	não urinar 2 horas antes da coleta	Coleta realizada em domicílio, desprezar os primeiros jatos e acondicionar em coletor universal. Volume mínimo 5 ml, refrigerar e encaminhar para o laboratório imediatamente. Não coletar do chão
Análise de cálculo urinário	7 dias	Acondicionar em coletor universal. Manter em temperatura ambiente	

## PARASITOLOGIA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Coproparasitológico 1 amostra	1 dia	Colher amostra fresca não exposta ao sol, acondicionar em coletor universal. Refrigerar, encaminhar para o laboratório em até 12 horas	
Coproparasitológico 3 amostras (M.I.F.)	1 dia	Colher amostra fresca não exposta ao sol, acondicionar em coletor universal com o conservante (MIF)	A amostra será colhida por 3 dias consecutivos
Pesquisa de ectoparasitas	1 dia	Exame de pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame	Para o exame de pele será realizado raspado profundo até produzir discreto sangramento.

## MICROBIOLOGIA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Cultura + antibiograma/aeróbica	7 a 10 dias	Cultura de urina/pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame	
Cultura para fungos	20 a 30 dias	Exame de pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 15 dias antes do exame	
Pesq. Malassezia pachydermatis	1 dia	Exame de pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 15 dias antes do exame	



## HISTOPATOLÓGICO/ CITOLOGIA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Histopatológico	15 dias	Material acondicionado em solução de formol a 10% Lâmina seca (imprint, squash)	
Citologia	15 dias		

## ENDOCRINOLOGIA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
T3	7-10 dias	jejum de 10 horas	
T4 total	7-10 dias	jejum de 10 horas	
T4 livre	7-10 dias	jejum de 10 horas	
TSH canino	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Cortisol	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Estradiol	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Progesterona	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Testosterona	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Insulina	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Fenobarbital	7-10 dias	jejum de 10 horas	
Supressão à dexametasona 2 determinações	7-10 dias	jejum de 10 horas	Coleta-se amostra de sangue entre 9h - 10h da manhã, em seguida é aplicado dexametasona e realizado outra coleta 8 horas após aplicação da medicação.
Supressão à dexametasona 3 determinações	7-10 dias	jejum de 10 horas	Coleta-se amostra de sangue entre 9h - 10h da manhã, em seguida é aplicado dexametasona e realizado outras coletas respectivamente 4 horas e 8 horas após aplicação da medicação

## IMUNOLOGIA

EXAME	PRAZO DE ENTREGA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Brucelose -B.canis (SAR)	5 dias	jejum não necessário	
Toxoplasmose	10 dias	jejum não necessário	
Dirofilaria Erliquia / Lyme/ Anaplasma (ELISA)	1 dia	jejum não necessário	
FIV e FeLV (ELISA)	1 dia	jejum não necessário	
Peritonite infecciosa felina (IFI)	30 dias	jejum não necessário	
Leptospirose	10 dias	jejum não necessário	



**OBS.: As orientações fornecidas pelo Setor Laboratorial servem como um padrão de orientação sobre as condições ideais para a realização dos exames. Não havendo sua necessidade em casos emergenciais.**